

HELIPROBE MÓDSZER A HELICOBACTER PYLORI GYOMORFERTŐZÉS KIMUTATÁSÁRA

Információ páciensek részére

Milyen kapcsolat van a Helicobacter pylori és a gyomorbetegségek között?

A fertőzés sokáig tünetmentes maradhat, de a fertőzött emberek esetében megnő az olyan betegségek kialakulásának kockázata, mint a gyomorhurut, gyomorfekély és egyéb gyomor-bél rendszeri panaszok.

A gyomorfekélyes megbetegedések nagy többsége Helicobacter pylori fertőzésnek tulajdonítható és ma már bizonyított tény, hogy a gyomorrák bizonyos fajtáinak kialakulásával is kapcsolatban áll.

Mi a gyomorfekély és melyek a jellemző panaszok?

A gyomornyálkahártya mélybe terjedő gyulladással károsodása, amely eléri a gyomorfal izomrétegét is. Jellemző tünete az égő, maró fájdalom, amely a gyomorszáj tájékán jelentkezik. A tudomány jelenlegi állása szerint a fekélybetegség kialakulása az alábbi három fő okra vezethető vissza:

- bizonyos fájdalomcsillapító szerek mellékhatása
- gyomorsav túltermelés
- Helicobacter pylori fertőzés

Hogyan lehet kimutatni a Helicobacter pylori fertőzést?

A fertőzés kimutatására többféle módszer létezik.

A légzési tesztek mellett a legelterjedtebbek:

- Endoszkópia
- Vérvizsgálat

Az endoszkópos vizsgálat során Ön helyi érzéstelenítés mellett lenyel egy keskeny, rugalmas csövet. A csövön keresztül az orvos megvizsgálja a nyelőcsövet, a gyomrot és a nyomelet, majd biopsziával mintát vesz a gyomor nyálkahártyájából. A mintát ezután laboratóriumba küldi, ahol mikrobiológia tenyésztés után megállapítják a diagnózist.

A Helicobacter pylori fertőzést követően a vérben a baktériumra jellemző antitestek jelennek meg, amelyek vérvételt követő vizsgálattal kimutathatóak. Az antitestek jelenléte a vérben utalhat arra, hogy a fertőzés fennáll, de arra is, hogy valamikor a múltban lezajlott. A vérvizsgálatból nem derül ki, hogy Ön jelenleg fertőzött vagy a korábbiakban volt fertőzött.

Mi a Helicobacter pylori?

A *Helicobacter pylori* baktérium egy spirál alakú mikroorganizmus, amely az emberi gyomrot fertőzi meg, és helyi gyulladást idéz elő. A fertőzés a világ népességének legalább 50 %-át érinti.

Hogyan működnek a fertőzés kimutatására használt légzési tesztek?


A légzési tesztek azon alapulnak, hogy a szájon át karbamidot adnak be.

H. pylori fertőzés esetén a karbamidot a gyomorban a baktérium elbontja hidrogén-karbonát ionra és ammóniára. A hidrogén-karbonát egy része szén-dioxiddá alakulva a kilélegzett levegővel távozik a szervezetből.

A kilélegzett levegőben megemelkedik a szén-dioxid mennyisége az eredeti állapothoz képest, ezért a kilélegzett levegőt összegyűjtik egy alkalmas eszközzel, majd szén-dioxid tartalmát megméri.

Hogyan működik a HELIPROBE™ módszer?

A HELIPROBE™ vizsgálathoz olyan karbamid molekulát állítanak elő, amely kismennyiségű radioaktív ¹⁴C izotópot tartalmaz.



H. pylori fertőzés esetén a karbamidból szén-dioxid keletkezik, amelyet egy légzési kártyán gyűjtnek össze a kilélegzett levegőből.

Amennyiben a fertőzés nem áll fenn, a karbamid a vizelettel távozik, és a többlet szén-dioxid a kilélegzett levegőben és a légzési kártyán nem jelenik meg.

A légzési kártyát egy erre a célra kifejlesztett HELIPROBE™ mérőkészülékbe helyezve állapítható meg, hogy megemelkedett-e a szén-dioxid mennyisége a kilélegzett levegőben, vagy sem.

HELIPROBE MÓDSZER A HELICOBACTER PYLORI GYOMORFERTŐZÉS KIMUTATÁSÁRA

Információ páciensek részére

Biztonságos a HELIPROBE™ vizsgálati módszer?

A ¹⁴C-szén izotóp természetben előforduló radioaktív izotóp, amely megtalálható a levegőben és az emberi szervezetben is.

A vizsgálat során a páciens csak akkora sugárterhelés éri, amely egyenértékű a természetesen jelenlévő környezeti háttérsugárzásból 24 óra alatt szerzett sugárterheléssel.

Ez nagyságrendekkel kisebb, mint például egy fogröntgenezés során szerzett sugárterhelés és mérhető kockázatot nem jelent a páciens számára.

Kiknél nem ajánlott a HELIPROBE™ vizsgálat?

Terhes nők esetében a vizsgálat nem javasolt.

A szoptatás időszakában csak úgy végezhető el, ha a szoptatást a vizsgálatot követő két napban felfüggesztik.

Nem ajánlott olyan pácienseknek sem, akiknél a gyomor egy részét, vagy teljes egészét eltávolították.

A vizsgálat nem ajánlott 18 év alattiaknak, de az orvos a kockázatok és előnyök mérlegelésével hozza meg döntését.

Hogyan történik a HELIPROBE™ vizsgálat?

1. A vizsgálat során szájon át kerül a szervezetbe a ¹⁴C-karbamid
2. 10 percet várni kell.
3. Ezután a páciensnek a légzési kártyába kell fújni a kilélegzett levegőt 1 - 4 percen át. A légzési kártyán található egy színkódolt indikátor pötty, amely jelzi, hogy mikor lehet abbahagyni a fújást. Amikor elegendő kilélegzett levegő összegyűlt a kártyán, az indikátor színe narancssárgából sárgába megy át.
4. Ezután a kártyát át kell adni az orvosnak kiértékelésre, a páciens részére a vizsgálat befejeződött.
5. Az orvos további műveleteket már nem végez a kártyával, hanem azonnal behelyezi a mérőkészülékbe, amely automatikusan kijelzi a mérési eredményt. A teljes vizsgálat kb. 20 percet vesz igénybe.



Mire kell ügyelni a HELIPROBE™ vizsgálat előtt?

A vizsgálat előtti 1 hónapban nem ajánlott antibiotikumok vagy bizmut tartalmú gyógyszerek szedése.

A vizsgálat előtti 1 hétben nem ajánlott savlekötő anyagok szedése.

A vizsgálat előtti 6 órában nem szabad étkezni. Vízet lehet inni, de a cukor és / vagy kalória tartalmú italok, mint a gyümölcslé, limonádé kerülendők.

Hol végezhető el a HELIPROBE™ vizsgálat?

A HELIPROBE™ vizsgálat otthon nem végezhető el. A vizsgálatot csak orvos végezheti el.

Jelenleg Magyarországon mintegy 95 orvosi intézményben végeznek HELIPROBE™ vizsgálatot, évente több mint 20 000 páciens esetében.

Amennyiben szeretne többet tudni a HELIPROBE vizsgálatról:

A HELIPROBE™ kártya és mérőberendezés forgalmazója Magyarországon:

IZOTOP
Izotóp Intézet Kft.

